



CHẤN THƯƠNG ĐẦU

Chấn thương đầu là gì?	<p>Chấn thương đầu là thuật ngữ dùng để chỉ bất kỳ loại chấn thương nào ở não, sọ hoặc da đầu. Mức độ chấn thương có thể dao động từ một vết sưng nhẹ hoặc bầm tím đến chấn thương sọ não. Các chấn thương đầu thường gặp bao gồm chấn động, vỡ xương sọ và vết thương da đầu.</p>																				
Nguyên nhân gây bệnh	<p>Chấn thương đầu gây ra bởi một cú đánh vào đầu thường do:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tai nạn xe• Té ngã hay bị ngã đập đầu xuống đường• Tán công vật lý• Đập đầu vào tường• Tai nạn liên quan đến thể thao <p>Trong hầu hết các trường hợp, hộp sọ sẽ bảo vệ bộ não khỏi bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, các chấn thương nghiêm trọng đủ để gây thương tích đầu cũng có thể gây chấn thương cột sống.</p>																				
Biểu hiện thường gặp	<table border="0"><tr><td>- Đau đầu</td><td>- Mất phương hướng nghiêm trọng</td></tr><tr><td>- Lâng lâng</td><td>- Không thể tập trung nhìn</td></tr><tr><td>- Chóng mặt</td><td>- Chuyển động mắt bất thường</td></tr><tr><td>- Nhảm lẫn nhẹ</td><td>- Mất kiểm soát cơ</td></tr><tr><td>- Buồn nôn</td><td>- Đau đầu dai dẳng hoặc trầm trọng hơn</td></tr><tr><td>- Mất ý thức</td><td>- Mất trí nhớ</td></tr><tr><td>- Co giật</td><td>- Thay đổi tâm trạng</td></tr><tr><td>- Ói mửa</td><td>- Rò rỉ dịch từ tai hoặc mũi.</td></tr><tr><td>- Có tiếng chuông trong tai</td><td></td></tr><tr><td>- Vấn đề cân bằng hoặc phối hợp</td><td></td></tr></table>	- Đau đầu	- Mất phương hướng nghiêm trọng	- Lâng lâng	- Không thể tập trung nhìn	- Chóng mặt	- Chuyển động mắt bất thường	- Nhảm lẫn nhẹ	- Mất kiểm soát cơ	- Buồn nôn	- Đau đầu dai dẳng hoặc trầm trọng hơn	- Mất ý thức	- Mất trí nhớ	- Co giật	- Thay đổi tâm trạng	- Ói mửa	- Rò rỉ dịch từ tai hoặc mũi.	- Có tiếng chuông trong tai		- Vấn đề cân bằng hoặc phối hợp	
- Đau đầu	- Mất phương hướng nghiêm trọng																				
- Lâng lâng	- Không thể tập trung nhìn																				
- Chóng mặt	- Chuyển động mắt bất thường																				
- Nhảm lẫn nhẹ	- Mất kiểm soát cơ																				
- Buồn nôn	- Đau đầu dai dẳng hoặc trầm trọng hơn																				
- Mất ý thức	- Mất trí nhớ																				
- Co giật	- Thay đổi tâm trạng																				
- Ói mửa	- Rò rỉ dịch từ tai hoặc mũi.																				
- Có tiếng chuông trong tai																					
- Vấn đề cân bằng hoặc phối hợp																					
Biến chứng	<p>Ổ tụ máu (Hematoma): là tình trạng máu nằm bên ngoài các mạch máu.</p> <p>Xuất huyết: là tình trạng chảy máu không kiểm soát được.</p> <p>Xuất huyết dưới màng não thường gây đau đầu và ói mửa.</p> <p>Chấn động não: Một chấn động não có thể xảy ra khi có tác động nghiêm trọng lên đầu, đủ để gây tổn thương não.</p> <p>Phù: tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn nếu xảy ra phù bên trong não.</p>																				

	<p>Vỡ hộp sọ: khiến cho đầu không thể chống đỡ được các chấn thương, do đó khiến não dễ bị tổn thương hơn.</p> <p>Tổn thương sọ trực lan tỏa: là một trong những loại chấn thương đầu nguy hiểm nhất, có thể dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn và thậm chí tử vong.</p>
Cận lâm sàng cần làm	<p>Chụp CT sọ não sẽ giúp bác sĩ phát hiện nứt sọ, chảy máu và đông máu, sưng não và bất kỳ tổn thương nào khác.</p> <p>Bạn cũng có thể được chụp MRI. Điều này có thể giúp bác sĩ thấy chi tiết hơn về bộ não.</p> <p>Các xét nghiệm khác tùy theo tình trạng bệnh và bệnh nền kèm theo.</p>
Hướng điều trị	<ul style="list-style-type: none"> - Việc điều trị chấn thương đầu phụ thuộc vào loại và mức độ nghiêm trọng của chấn thương. - Với chấn thương đầu nhẹ, thường không có triệu chứng nào ngoài đau ở chỗ bị thương. Trong những trường hợp này, bác sĩ có thể chỉ định cho bạn acetaminophen để giảm đau. - Bác sĩ có thể yêu cầu phẫu thuật khẩn cấp để ngăn chặn tổn thương thêm cho bộ não, chẳng hạn như: <ul style="list-style-type: none"> - Loại bỏ ổ tụ máu - Sửa chữa hộp sọ - Giải phóng áp lực trong hộp sọ.
Chế độ theo dõi và phòng ngừa	<ul style="list-style-type: none"> - Việc điều trị chấn thương đầu phụ thuộc vào loại và mức độ nghiêm trọng của chấn thương. - Với chấn thương đầu nhẹ, thường không có triệu chứng nào ngoài đau ở chỗ bị thương. Trong những trường hợp này, bác sĩ có thể chỉ định cho bạn acetaminophen để giảm đau. - Bác sĩ có thể yêu cầu phẫu thuật khẩn cấp để ngăn chặn tổn thương thêm cho bộ não, chẳng hạn như: <ul style="list-style-type: none"> • Loại bỏ ổ tụ máu • Sửa chữa hộp sọ • Giải phóng áp lực trong hộp sọ.