



BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG  
KHOA NỘI TIẾT

**PHIẾU TÓM TẮT  
THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ**

### HỘI CHỨNG CUSHING DO THUỐC

<b>Bệnh Hc Cushing do thuốc là gì?</b>	Hội chứng Cushing do điều trị glucocorticoid là nguyên nhân thường gặp nhất trong các nguyên nhân suy thượng thận thứ phát, xảy ra do glucocorticoid ức chế vùng hạ đồi tuyến yên làm giảm tiết ACTH.
<b>Nguyên nhân gây bệnh</b>	Nguyên nhân do dùng glucocorticoid kéo dài: prednisolone, hydrocortisone, dexamethasone... loại glucocorticoid hít, tiêm khớp, tiêm bắp, glucocorticoid được trộn trong thuốc gia truyền...
<b>Những yếu tố nguy cơ của bệnh</b>	tiền sử có dùng corticoid, ngưng thuốc đột ngột, có bệnh khác đi kèm...
<b>Biểu hiện thường gặp của bệnh</b>	Tăng cân, mặt tròn, béo trung tâm, mỡ vùng cổ, sau gáy, mặt tròn đỏ, da mỏng, rạn da, yếu cơ gốc chi, vết thương khó lành, rối loạn tâm thần, loãng xương, Chán ăn, buồn nôn, nôn ói, đau cơ, đau nhức, sốt cao, bong vảy da, huyết áp thấp ...
<b>Biến chứng</b>	Suy thượng thận cấp, tụt huyết áp, nhiễm trùng huyết, tử vong...
<b>Các xét nghiệm cần làm</b>	Cortisol máu, điện giải đồ, công thức máu...
<b>Hướng điều trị</b>	Bù dịch, điện giải, Glucocorticoid, điều trị cách bệnh đi kèm
<b>Chế độ theo dõi và phòng ngừa</b>	Đeo thẻ ghi tình trạng bệnh Uống thuốc theo toa