



BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
KHOA NGOẠI TIÊU HÓA

**PHIẾU TÓM TẮT
THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ**

PHẪU THUẬT CẮT BỎ BÚI TRĨ

Hướng điều trị	Người bệnh phải nhịn ăn uống theo yêu cầu bác sĩ Khám trước mổ Ngoại khoa: phẫu thuật cắt bỏ búi trĩ. Kháng sinh, giảm đau (nếu cần)
Biến chứng (nếu có)	<ul style="list-style-type: none">- Chảy máu sau mổ.- Nhiễm trùng vết mổ.- Đau- Hẹp hậu môn- Bí đái (thường gặp sau gây tê tủy sống)- Mất tự chủ hậu môn (thường tồn tại trong vòng 30 ngày sau mổ)
Theo dõi sau mổ	Ngâm rửa hậu môn sau khi đại tiện và trước khi thay băng Uống nhiều nước, thức ăn nhiều chất xơ, ăn nhiều trái cây. Tránh tư thế ngồi lâu, tránh tư thế đứng quá lâu, tránh rặn khi táo bón, tránh các động tác quá sức, tập đi đại tiện đúng giờ. Nếu người bệnh thấy có các dấu hiệu như đại tiện ra máu, chảy dịch ở hậu môn, đại tiện không tự chủ thì đến tái khám ngay